

CHIRURGIE DE LA CATARACTE

Points critiques peropératoires à haut risque d'endophtalmie (retour d'expérience terrain)

OBJECTIF

Identifier des micro-écarts peropératoires à fort impact infectieux, souvent non perçus, mais pouvant contribuer à la survenue d'endophtalmies.

👉 Analyse issue d'un cluster de cas sans cause unique identifiée

DÉSINFECTION CONJONCTIVALE INEFFICACE (EFFET "INVISIBLE")

Pratique à risque

- Désinfection des culs de sac conjonctivaux
- Puis instillation rapide d'un collyre (anesthésique)



Mécanisme

- Effet de **lavage immédiat de l'antiseptique**
- Disparition du produit avant action
- **Temps de contact non effectif malgré respect apparent du protocole**

Risque

- Persistance de la flore conjonctivale
- Contamination intraoculaire directe

CORRECTION

- Respect strict d'un **temps de contact réel ≥ 2 minutes**
- Ne rien instiller entre désinfection et incision
- Repenser la **chronologie des gestes**

DRAPAGE INSUFFISANT : CILS DANS LE CHAMP OPÉRATOIRE

Pratique à risque

- Cils présents dans le champ opératoire
- Recouvrement incomplet
- Ajustements secondaires (section, repositionnement)



Point explicitement identifié dans les préconisations

Mécanisme

- Les cils constituent un **réservoir bactérien majeur (flore palpébrale)**
- Contact direct ou indirect avec le site opératoire
- Mobilisation des cils en cours d'intervention

Risque

- Inoculation bactérienne directe
- Endophtalmie

CORRECTION

- Utilisation de **sets de drapage spécifiques ophtalmologie**
- **Exclusion complète et stable des cils dès le départ**
- Ne jamais "rattraper" un drapage en cours d'intervention

GESTION DES GANTS : RUPTURE D'ASEPSIE NON PERÇUE

Pratique à risque

- Absence de changement de gants après :
 - badigeon
 - drapage
 - réglages techniques



Mécanisme

- Contamination progressive des gants
- Introduction de germes au moment critique (implant, incision)

Risque

- Contamination du champ opératoire

CORRECTION

- Changement systématique :
 - avant incision
 - avant manipulation de l'implant
- Sécurisation des séquences critiques

UTILISATION DU BSS : CONTAMINATION SECONDAIRE POSSIBLE

Pratique à risque

- Utilisation d'un flacon commun
- Prélèvements répétés / re-piochage
- Utilisation de cupule



Mécanisme

- Contamination progressive du liquide
- Injection intraoculaire secondaire

Risque

- Endophtalmie

CORRECTION

- Utilisation de **petits volumes stériles à usage unique**
- Circuit fermé privilégié
- Ne jamais re-prélever dans un contenant commun

ANTIBIOPROPHYLAXIE (CÉFUROXIME) : PERTE D'EFFICACITÉ

Pratique à risque

- Préparation anticipée
- Injection différée



Mécanisme

- Perte de stérilité / stabilité
- Diminution efficacité antibiotique

Risque

- Défaut de prévention de l'infection

CORRECTION

- Préparation **immédiatement avant injection**
- Respect strict des recommandations

DISPOSITIFS MÉDICAUX RÉUTILISABLES COMPLEXES

Pratique à risque

- Utilisation persistante de **canules intraoculaires réutilisables** (type Rycroft / Charleux)



Certaines pratiques historiques persistent mais ne sont plus adaptées au niveau d'exigence actuel.

Mécanisme

- Dispositifs à lumière fine
- Nettoyage difficile → rétention biologique
- Risque de biofilm

Risque

- Contamination intraoculaire

CORRECTION

- **Privilégier l'usage unique**
- À défaut :
 - irrigation immédiate
 - traitement rigoureux
 - traçabilité

TRAITEMENT DES DM : DÉLAI CRITIQUE NON RESPECTÉ

Pratique à risque

- Pré-désinfection retardée
- Non immersion immédiate



Mécanisme

- Séchage des souillures
- Fixation protéique
- Échec du nettoyage

Risque

- Défaut de stérilisation

CORRECTION

- Pré-désinfection **immédiate**
- Irrigation des lumières
- Traçabilité obligatoire

HYGIÈNE DES MAINS CHIRURGICALE NON OPTIMALE

Pratique à risque

- Friction incomplète
- Essuyage prématuré



Mécanisme

- Réduction insuffisante de la flore

Risque

- Contamination indirecte

CORRECTION

- Respect strict de la DCMF
- Formation et réévaluation régulière

MESSAGES CPIAS NOUVELLE-AQUITAINE

👉 "Dans les situations analysées, aucune cause unique n'a été identifiée."

👉 "C'est l'accumulation de micro-écarts peropératoires qui constitue le principal facteur de risque."