



ENQUÊTE PERTINENCE DE LA POSE D'UN CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

Objectif

Identifier la prévalence des patients porteurs de cathéter veineux périphérique (CVP) et la prévalence de la pertinence de pose de ces CVP.

Permettre aux spécialistes de la prévention des infections d'obtenir des éléments chiffrés sur la pose des CVP afin d'aider à cibler le ou les services sur lesquels une analyse complémentaire pourra être menée.

Population

Etablissements de santé. Possibilité d'intégrer les services des urgences (inclusion des patients ayant été pris en charge).

Quand

A l'occasion de l'enquête de prévalence ou de façon indépendante à tout moment. Les évaluations peuvent être répétées.

Mise en oeuvre dans les services

Après avoir informé l'équipe de soins, le référent de l'enquête se rend dans chaque service un jour donné, il note le nombre de patients, identifie les patients porteur d'un CVP et recherche pour ces derniers le lieu de pose du CVP. Si ce dernier a été posé dans le service, il recherche alors dans le dossier du patient l'indication de la pose pour évaluer sa pertinence, et la présence d'une prescription médicale. La pertinence du maintien n'est pas évaluée ici.

Indications pertinentes pour la pose d'un cathéter veineux périphériques

Indications élaborées à partir de **l'enquête de pertinence du maintien du CPlas Occitanie** et d'une revue d'experts réalisée pour une **enquête de pertinence menée au CHU de Rouen** :

- Voie orale impossible (nausée, vomissements, troubles de la déglutition, coma, troubles de la vigilance, patient à jeun)
- Instabilité hémodynamique et/ou métabolique ou post-opératoire immédiat (24h à 48h) : couvre notamment les indications liées à une incertitude d'évolution clinique sur une très courte durée
- Réalisation de bilan sanguin multi-prélèvements
- Traitement intraveineux récent < ou =48h avec maintien de la voie orale incertaine
- Produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang (+/- 24h)
- Réhydratation, rééquilibration hydroélectrolytique, remplissage vasculaire,
- Traitement en perfusion continue (seringue auto-pousseuse)
- Produit de contraste (imagerie prévue dans les 48h)
- Autre traitement intraveineux administrable uniquement par voie parentérale
- Produits administrables per os mais biodisponibilité diminuée

Si le CVP n'a pas été posé dans le service, c'est-à-dire qu'il a été posé : dans un autre service de l'établissement, ou dans un autre établissement, ou posé en extérieur par les pompiers ou le SMUR, alors le référent cherche à savoir si la pertinence de la présence du cathéter a été évaluée à l'arrivée du patient (mot dans le dossier, justification clinique...).

Un retour sera à faire aux équipes concernées. L'objectif attendu est celui d'une pose pertinente pour 100% des cathéters. Un chiffre inférieur engage les référents à échanger avec les équipes et à initier des actions de surveillance, formation et sensibilisation. La liste des outils disponibles est accessible sur la page dédiée du CPias Nouvelle-Aquitaine **Cathéter veineux périphérique - CPias Nouvelle Aquitaine (cpias-nouvelle-aquitaine.fr)**

Spécialités (celles de l'enquête de prévalence - HAD incluse - + urgences)

Médecine

Cancérologie, oncologie médicale	01
Cardiologie, cardio-vasculaire	02
Dermatologie, vénérologie	03
Endocrinologie, nutrition	04
Gastro-entérologie, hépatologie	05
Gynécologie médicale	06
HAD	07
Hématologie	08
Maternité	09
Maladies infectieuses et tropicales	10
Médecine interne	11
Néonatalogie	12
Néphrologie	13
Neurologie	14
Pédiatrie	15
Pneumologie	16
Polyvalente	17
Rhumatologie	18
Rééd. fonctionnelle, SSR, convalescence	19
Gériatrie, SLD	20
Psychiatrie	21
Gériatrie court séjour	22
Soins intensifs / Soins continus	53

Réanimation

Réanimation cardiologique	23
Réanimation chirurgicale	24
Réanimation infantile / pédiatrique	25
Réanimation médicale	26
Réanimation néonatale	27
Réanimation néphrologique	28
Réanimation neurologique	29
Réanimation polyvalente	30
Réanimation pneumologique	31
Réanimation brûlés	32

Chirurgie

Chirurgie cardiaque	33
Chirurgie cardio-vasculaire	34
Chirurgie digestive	35
Chirurgie générale	36
Chirurgie infantile / pédiatrique	37
Chirurgie orthopédique et traumatique	38
Chirurgie plastique et reconstructrice	39
Chirurgie thoracique	40
Chirurgie vasculaire	41
Généco-obstétrique	42
Neuro-chirurgie	43
Ophtalmologie	44
O.R.L.	45
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	46
Urologie	47
Soins intensifs / Soins continus	54

Greffe

Greffes cardiaques	48
Greffes de moelle	49
Greffes rénales	50
Greffes hépatiques	51

Autres

Autres	52
Urgences	55

Accès à l'application

L'inscription à l'application se fait en ligne en autonomie sur le site du CPias Nouvelle-Aquitaine. **A l'occasion de l'enquête de prévalence ou de façon indépendante à tout moment. Les évaluations peuvent être répétées.**

Les identifiants pour l'enquête régionale de prévalence en Nouvelle-Aquitaine permettent d'accéder directement à l'enquête. Cette enquête est ouverte à tous et n'est pas réservée à la Nouvelle-Aquitaine.

Une fois connecté, le référent saisit des données agrégées pour chaque service dans l'application en ligne et bénéficie d'un poster de résultats automatisé par établissement et par service.



ENQUÊTE PERTINENCE DE LA POSE D'UN CVP

FICHE SERVICE POUR LA SAISIE DANS L'OUTIL CPIAS

Date de l'enquête

JOUR	MOIS	ANNÉE

Q1- Nom du service

Q2- Spécialité

Q3- Nombre de patients présents le jour de l'enquête

Q4- Nombre de patients porteurs d'au moins un CVP le jour de l'enquête

Q5- Nombre de CVP comptabilisés le jour de l'enquête

Q6- Nombre de CVP posés dans le service
dont

Q6.1- Nombre de CVP ayant fait l'objet d'une prescription médicale

Q6.2- Nombre de CVP pour lesquels l'indication de pose était pertinente

Q7- Nombre de CVP posés dans un autre service
dont

Q7.1- Nombre de CVP pour lesquels la pertinence de la présence a été
évaluée à l'arrivée du patient

L'addition des Q6 et Q7 doit correspondre au total indiqué à la Q5

Pour toute question

cpias.na@chu-bordeaux.fr

ENQUÊTE PERTINENCE DE LA POSE D'UN CVP

FICHE DE RECUEIL CVP - À PRENDRE DANS LE SERVICE LE JOUR DE L'ENQUÊTE

Date de l'enquête JOUR / MOIS / ANNÉE
 Nom du service
 Spécialité

Nombre de patients présents le jour de l'enquête

Nombre de patients porteurs d'au moins un CVP le jour de l'enquête

Nombre de CVP comptabilisés le jour de l'enquête

Remplir un questionnaire « CVP » pour chaque cathéter veineux périphérique porté par un patient le jour de l'enquête (entourer les bonnes réponses). Utiliser plusieurs fiches de recueil si plus de 5 cathéters.

CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

☐ ☐

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

☐ ☐

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

☐ ☐

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

☐ ☐

CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

☐ ☐

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

☐ ☐

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

☐ ☐

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

☐ ☐

CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

☐ ☐

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

☐ ☐

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

☐ ☐

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

☐ ☐

CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

☐ ☐

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

☐ ☐

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

☐ ☐

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

☐ ☐

CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

☐ ☐

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

☐ ☐

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

☐ ☐

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

☐ ☐

Pour toute question

cpias.na@chu-bordeaux.fr