

Les gants au bon moment !


Résultats du quizz régional en EHPAD




Evelyne Boudot

ARLIN Languedoc Roussillon

Remerciements Cécile Mourlan



Mission mains propres 2016
« L'hygiène des mains, c'est tout le temps »



Contexte

Campagne Mission Mains Propres

L'hygiène des mains, c'est tout le temps

- 9 mai : Thème 1 « l'hygiène de mes mains, mon geste santé quotidien »
- 10 mai : Thème 2 « Je me désinfecte les mains, je vous protège »
- 11 mai : Thème 3 « Désinfection des mains : mieux informé, bien protégé »
- 12 mai : Thème 4 « Les gants au bon moment »
- 13 mai : Thème 5 « L'hygiène des mains, parlons-en »



Campagne Mission Mains Propres

- Défi proposé aux établissements de la région
« Les gants au bon moment ! »
- Quizz sur le port des gants sur la population soignante/technique des établissements ES et EHPAD
 - En référence au quizz de 2010 du CCLIN Sud-Ouest





Quizz « Gants » CCLINSO Journée mains mai 2016 Etes-vous un expert du port des gants ?



Votre catégorie professionnelle :

☐ Infirmier/IADE/IBODE
☐ Sage Femme/Puer.

☐ A.Soinnants/A.Puer
☐ ASH

☐ Médecin/pharmacien
☐ Etudiants

☐ Autres : préciser
.....

Les situations suivantes vous paraissent-elles adaptées?

1

Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants.

☐ Adapté ☐ Non adapté

2

Un kinésithérapeute aide un patient à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls.

☐ Adapté ☐ Non adapté

3

Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR.

☐ Adapté ☐ Non adapté

4

Le port systématique des gants lors des soins permet de limiter le risque d'épidémie.

☐ Adapté ☐ Non adapté

5

Un soignant essuie sans gants une surface souillée par du sang.

☐ Adapté ☐ Non adapté

6

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants.

☐ Adapté ☐ Non adapté

7

Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact ».

☐ Adapté ☐ Non adapté

8

Une aide-soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants.

☐ Adapté ☐ Non adapté

9

Une IDE pose un cathéter sous-cutané sans gants.

☐ Adapté ☐ Non adapté

10

Un aide soignant dépose avec des gants le plateau repas d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact ».

☐ Adapté ☐ Non adapté

Questions

Campagne Mission Mains Propres

- Mise à disposition :
 - Grille de questions et de son corrigé
 - Outil **Excel** élaboré par l'ARLIN pour la saisie des réponses avec
 - tableaux de résultats
 - graphiques automatiquement remplis.
- Exploitation en interne des résultats en identifiant les situations les moins conformes
 - Distribution du **corrigé**



Réponses



Quizz « Gants » CCLIN SO Journée mains mai 2016

Etes-vous un expert du port des gants ?

Réponses



ARlin Languedoc Roussillon

1



Non adapté

Il est recommandé de retirer les gants dès la fin de chaque soin ou geste à risque d'exposition aux liquides biologiques avant de réaliser un nouveau soin ou de toucher l'environnement.

2



Adapté

Le port des gants est indiqué dès qu'il y a un risque de contact avec un liquide biologique. Le port des gants ne dispense pas d'une hygiène des mains.

3



Adapté

Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.

4



Non adapté

Les gants se contaminent au cours des soins et peuvent constituer un vecteur de transmission pour les micro-organismes.

5



Non adapté

Le port des gants est indiqué dès qu'il y a un risque de contact avec un liquide biologique.

6



Non adapté

Dans une séquence de soins à risque d'exposition ou de contact avec un liquide biologique, pour un même patient, une nouvelle paire de gants doit être portée pour chacun de ces soins afin de maîtriser le risque de transmission de micro-organismes d'un site à l'autre.

7



Non adapté

Le port des gants n'est pas indiqué en cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR de type SARM.

8



Adapté

Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée.

9



Non adapté

Le port des gants est indiqué avant tout soin exposant à un risque de piqûre.

10



Non adapté

Quel que soit le statut infectieux d'un patient, le port systématique des gants n'est pas recommandé avant de toucher l'environnement du patient.

Votre score (nombre de bonnes réponses) :

/10

Vous avez 10 bonnes réponses : vous méritez le Gant d'Or, le port des gants n'a aucun secret pour vous !

Vous avez 8 ou 9 bonnes réponses : vous méritez le Gant d'Argent : Encore un petit effort, le port des gants n'aura bientôt plus de secret pour vous !

Vous avez 6 ou 7 bonnes réponses : vous méritez le Gant de Bronze : demandez un coup de main à votre équipe d'hygiène et à votre correspondant pour aider à lever la part de mystère qui persiste !

Vous avez moins de 6 bonnes réponses : vous recevez le Gant de Boite : sollicitez d'urgence votre équipe opérationnelle d'hygiène et votre correspondant pour donner du punch à vos pratiques !

Semaine du 9 au 13 mai 2016

- Réalisation de l'enquête
- Invitation à s'inscrire sur le site du ministère de la santé en qualité de suiveur de notre défi.


L'hygiène des mains, c'est tout le temps

- 9 mai : Thème 1 « l'hygiène de mes mains, mon geste santé quotidien »
- 10 mai : Thème 2 « Je me désinfecte les mains, je vous protège »
- 11 mai : Thème 3 « Désinfection des mains : mieux informé, bien protégé »
- 12 mai : Thème 4 « Les gants au bon moment »
- 13 mai : Thème 5 « L'hygiène des mains, parlons-en »



Participation

	EHPAD
Infirmier-IADE-IBODE	19
Sagefemme-Puericultrice	0
Aide soignant - Aux.puer	59
ASH	43
Médecin/pharmacien	0
Étudiant	8
Autres	7
Toutes catégories	136




Points positifs

Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants

BR : **non adapté**



Retrait des gants dès la fin de chaque soin



Points positifs

Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants

BR : **non adapté**




Un kiné aide un résident à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls


BR : **adapté**



Retrait des gants dès la fin de chaque soin



Port de gant indiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique




Points positifs

Un aide soignant vide les poches à urine de plusieurs patients en série avec la même paire de gants

BR : **non adapté**



Retrait des gants dès la fin de chaque soin




Un kiné aide un résident à expectorer avec des gants, les retire, réalise une friction des mains, puis lui prend son pouls

BR : **adapté**



Port de gant indiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique




Un soignant essuie sans gants une surface souillée par du sang

BR : **non adapté**



Port de gant indiqué dès qu'il y a risque de contact avec un liquide biologique




Points positifs

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants

BR : **non adapté**



Port d'une nouvelle paire de gants à chaque soin dans une séquence afin de maîtriser le risque de transmission de MO d'un site à l'autre




Points positifs

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants

BR : **non adapté**



Port d'une nouvelle paire de gants à chaque soin dans une séquence afin de maîtriser le risque de transmission de MO d'un site à l'autre




Une aide soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants

BR : **adapté**



Port de gant indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec des muqueuses ou la peau lésée



Points positifs

« Se protéger »


Utilisation des gants dans le but de protéger le professionnel

Une infirmière pose un cathéter, puis refait le pansement d'un patient, avec la même paire de gants

BR : **non adapté**



Port d'une nouvelle paire de gants à chaque soin dans une séquence afin de maîtriser le risque de transmission de MO d'un site à l'autre




Une aide soignante réalise la toilette intime d'un patient avec des gants

BR : **adapté**



Port de gant indiqué avant tout soin exposant à un risque de contact avec des muqueuses ou la peau lésée




Une infirmière pose un cathéter sous cutané sans gants

BR : **non adapté**



Port de gant indiqué avant tout soin exposant à un risque de piqûre



12% en MCO


A améliorer

Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR

BR : **adapté**



Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR



A améliorer


Une IDE réalise sans gants de protection et avec un tablier la toilette corporelle (visage et thorax) d'un patient porteur d'une BMR

Le port systématique des gants lors des soins permet de limiter le risque d'épidémie

BR : **adapté**




Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR



BR : **non adapté**



Contamination des gants au cours des soins et possible vecteur de transmission pour les micro organismes




A améliorer

Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions « contact »

BR : **non adapté**



Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR



A améliorer


« PEC des résidents
BMR »

Un manipulateur radio réalise avec des gants un acte auprès d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions
« contact »

BR : **non adapté**



Pas de port de gants indiqué dans le cas de contact avec la peau saine même chez un patient porteur d'une BMR




Un aide soignant dépose avec des gants le plateau repas d'un patient porteur d'un SARM bénéficiant de précautions
« contact »

BR : **non adapté**



Port systématique de gants non recommandé avant de toucher l'environnement du patient quel que soit son statut infectieux



Recommandations nationales

Prévention de la transmission
croisée : précautions
complémentaires contact

Consensus formalisé d'experts
Avril 2009



3.2.2.2 PORT DE GANTS

R94 : Il est recommandé de ne pas mettre systématiquement des gants de soins non stériles

- en entrant dans la chambre, (AF)
- avant de pratiquer un soin sur peau saine, (AF)
- avant de toucher l'environnement proche, (AM)

d'un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact.

Cette recommandation ne prend pas en compte la problématique de la prise en charge de certains micro-organismes comme *Clostridium difficile* toxinogènes, entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG)... tel qu'indiqué dans le périmètre de ces recommandations.



Fiche mémo : mesures à appliquer pour un résident porteur de BMR/BHRe

KIT BMR/BHRe POUR LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Établissements d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes,
Foyers d'Accueil Médicalisés et Maisons d'Accueil Spécialisées,
Instituts Médico-Educatifs...

Avril 2015

TOILETTE, PRÉVENTION D'ESCARRE, RÉFECTION DU LIT ET LINGE DU RÉSIDENT

RÉSIDENT

- linge de toilette changé après chaque toilette ;
- savon personnel ;
- pansement : clos et propre, sinon réfection.

PERSONNEL

- tablier plastique à usage unique ;
- gants à usage unique non stériles seulement si contact avec liquides biologiques, muqueuses (toilette génitale), linge souillé ou si peau lésée ; friction hydro-alcoolique au retrait ;
- masque et lunettes à proximité du patient qui tousse ;
- lavage simple des mains si utilisation de produits pour la prévention d'escarre ;
- friction hydro-alcoolique sur mains sèches : avant le soin, après retrait des équipements de protection, avant de sortir de la chambre.

Remerciements

A l'ensemble des EHPAD qui ont
participé au défi « gants »

