



Outils d'analyse approfondie des causes du nouveau pour la prévention des ISO



Dr AG Venier
Réunion des hygiénistes Nouvelle-Aquitaine
23 novembre 2017

Analyse approfondie des causes



Reconstitution de la chronologie

Identification des écarts

Recherche de l'ensemble des causes des événements recensés

Choix des actions correctives et mise en œuvre

Méthodes HAS

CPIAS peut apporter son aide si besoin

Démarche collective, participation de l'ensemble des acteurs concernés

Finalité = actions efficaces + implication des professionnels

ISO : causes profondes imparfaitement analysées



Complexité

- Beaucoup d'acteurs
- Plusieurs services / établissements concernés
- Connaissances techniques + recos sociétés savantes



Outils d'AAC



Bactériémie à SARM

Bactériémie en néonatalogie

Infection urinaire associée aux soins

<http://www.cpias.fr/ES/gestiondesrisques/analysedescauses.html>

CPias

Réseau national
de prévention des infections associées aux soins



SIGNALEMENT	SURVEILLANCE	SENSIBILISATION	PREVENTION	EVALUATION	GESTION DES RISQUES
-------------	--------------	-----------------	------------	------------	---------------------

Analyse des causes

L'analyse d'un problème ne peut pas se limiter à la connaissance des causes directes et immédiates. Dans une démarche qualité, il faut surtout s'attacher à faire une analyse des causes profondes permettant de mettre en place le bon dispositif de correction. Pour en savoir plus, contactez votre Arlin !

Outil d'aide à l'analyse des causes des infections urinaires associées aux soins

Outil d'aide à l'analyse des causes des bactériémies nosocomiales acquises survenant en néonatalogie


Outil d'aide au suivi des CREX (comité de retour d'expérience)

Outil d'aide à l'analyse des causes des bactériémies nosocomiales acquises à SARM

Outil d'aide à l'analyse des causes des infections des site opératoire (ISO)

Cet outil a pour vocation d'aider les établissements de santé dans la conduite d'une analyse approfondie des causes de la survenue des infections du site opératoire (ISO).

Cet outil propose une méthode reconnue permettant l'identification des causes de survenue d'une ISO et la mise en place d'actions d'amélioration afin d'éviter la survenue ultérieure d'évènement similaire.




❖ Cet outil permet de tracer l'analyse des causes des infections du site opératoire et de suivre la mise en œuvre des actions d'amélioration.

❖ Afin d'aider les professionnels, des listes des principaux écarts ou causes immédiates et des causes profondes susceptibles d'être identifiées, sont proposées lors de l'analyse.

Les macros doivent obligatoirement être activées. Si ce n'est pas le cas, se reporter à l'aide.

Dans chaque onglet, vous ne pouvez saisir des données que dans les cases jaunes.



**Guide
d'utilisation**

Liste des ISO

**Accès aux
référentiels**

Cet outil est une première version qui sera amenée à évoluer et à s'enrichir chaque année en intégrant les retours des utilisateurs afin d'en faire un véritable outil participatif. A cette fin, vous pouvez contacter le CPIAS Nouvelle Aquitaine (tél : 05 56 79 60 58) pour donner vos avis et commentaires.

3

Chronologie de la prise en charge		Ecart(s) / Causes immédiates
Pré-opératoire	<i>Acte(s) invasif(s) dans les 3 mois précédents l'intervention (pour certains micro-organismes à croissance lente, la porte d'entrée peut survenir avant l'intervention)</i>	Antiseptie cutanée non optimale avant infiltration/injection sur le site concerné
		Hygiène des mains et toiles non adaptées avant infiltration/injection sur le site concerné
		Règles d'asepsie lors des soins non adaptées
		Gestion des antiseptiques non adaptée
		Extraction du matériel non adapté
		Stockage et préparation des médicaments non adaptés
	Consultation(s) pré-opératoire(s)	Évaluation et gestion des facteurs de risque du patient non adaptés (ex: diabète, obésité, âge, immunosuppression, traitement des infections préexistantes, etc.)
		Indication chirurgicale non adaptée
		Dépistage et décolonisation du S. Aureus non adaptés
		Réalisation de bandedette urinaire/ECBU avant l'intervention non adaptée (ex: chirurgie urologique programmée)
		Information donnée au patient inadéquate (contenu, forme, support, modalités)
		Si ambulatoire: évaluation du risque lié au retour à domicile non adaptée (état clinique, cognitif et social du patient, prise en charge prévue)
	Patient	Dépilation non adaptée par le patient avant l'intervention (ex: rasoir, épilation cire) sur le site opératoire ou à proximité
		Soins non optimaux des ongles par le patient (ex: douche, régime, traitement, hygiène bucco-dentaire)
		Présence de plaie cutanée, escarre, dermatose
		Absence d'arrêt du tabac
	Jour de l'intervention	Douche(s) pré-opératoire(s) non adaptée(s)
		Vérification de la douche non optimale
		Aide à la douche non proposée ou non optimale
		Vérification de l'absence de contre-indication à l'intervention non réalisée ou non optimale (ex: infection en cours)
		Intervention réalisée malgré contre-indication connue
Accueil / Ecart(s) - Causes immédiates / Causes Profondes / Liste des ISO / AAC 1 / Guide d'utilisation / Aide sur les macros / Référentiels		

Outils d'AAC des ISO



Prochainement disponible ...

Cherche établissements souhaitant tester l'outil!

