

**De:** CCLIN SUD-OUEST <mailings.cclinso@chu-bordeaux.fr>  
**Envoyé:** jeudi 27 octobre 2016 16:20  
**À:** Elisabeth SOUSA  
**Objet:** CCLIN SO : Recommandations HCSP mcr-1  
**Pièces jointes:** hcspa20160927\_enterobactresistcolistinemesures.pdf

## **A l'attention des équipes opérationnelles d'hygiène et des bactériologistes**

*Bordeaux, le 27 octobre 2016*

Madame, Monsieur, chers collègues,

Veillez trouver ci-joint l'avis du HCSP concernant la résistance plasmidique à la colistine codée par le gène mcr-1. Les recommandations de ce texte diffèrent de celles du MARS du 2 septembre.

**Désormais, la résistance à la colistine et la présence du gène mcr-1 sont à rechercher uniquement chez certaines Entérobactéries Produisant une Carbapénémase (EPC).**

Les EPC concernées sont :

- les EPC découvertes lors d'un dépistage à l'admission chez un patient hospitalisé hors métropole dans l'année
- ou les EPC identifiées dans un prélèvement à visée diagnostique dans un contexte nécessitant le recours à la colistine.

Le HCSP précise que des recommandations seront prochainement diffusées pour préciser les modalités de détection de la résistance à la colistine et du gène mcr-1.

Restant à votre disposition.

Cordialement,

**Dr Anne-Gaëlle VENIER**

CCLIN Sud-Ouest

CHU Pellegrin

33076 Bordeaux cedex

Tel : 05.56.79.60.58 Fax : 05.56.79.60.12

