

CONTEXTE

- ◆ Souhait d'harmoniser au niveau régional les mesures proposées dans les secteurs SSR et EHPAD
- ◆ Les mesures proposées sont à adapter en fonction des protocoles et de l'organisation locale des établissements. La prise en charge est à adapter à la symptomatologie du patient/résident

PRE-REQUIS

- ◆ Respect des mesures barrières par les patients/résidents et par les professionnels de santé à tout moment (y compris pauses repas, transmissions...)
- ◆ Précautions standard

Accueil de patients ou résidents asymptomatiques, non suspect de Covid-19, venant de leur domicile ou d'un établissement de santé sans notion de contact Covid-19

SSR

- ◆ Accès possible aux parties communes de l'établissement, à discuter en fonction de l'organisation et des possibilités dans le respect des mesures barrières

EHPAD / ESMS

- ◆ Pendant 14 jours :
 - Chambre individuelle
 - Pas d'accès aux parties communes de l'établissement

Accueil de patients ou résidents ayant une infection (confirmée ou suspectée) à Covid-19



J0-J14

Mesures Covid-19

= Chambre individuelle + **Précautions Gouttelettes et Contact** + EPI adaptés : lunettes, surblouse et/ou tablier + si geste générateur d'aérosol (séances de kinésithérapie respiratoire génératrices d'aérosol ou de toux induite...) : masque FFP2, en remplacement du masque chirurgical

Surveillance des signes cliniques d'aggravation



J14-J28

Sous réserve que **depuis au moins 48 heures** :

- ◆ disparition de la fièvre (vérifiée par une température inférieure ou égale à 37,5°C, mesurée deux fois par jour en l'absence de toute prise d'antipyrétique depuis au moins 12 heures)
- ◆ **et** disparition d'une éventuelle **dyspnée** (fréquence respiratoire inférieure à 22/min au repos)*

Levée des mesures Covid-19

Port du masque par le patient/résident lors des soins et pur les sorties de la chambre**

** mesures de prise en charge à adapter en fonction de la symptomatologie (exemple d'une toux dont l'évaluation médicale peut conduire à l'indication de précautions gouttelettes)

* Si pas de signes de respiratoire initial mais autre symptôme initial tel que diarrhée, disparition de la diarrhée
Certains symptômes peuvent persister après guérison et doivent faire l'objet d'une évaluation : toux, anosmie, dysgueusie...

SOURCES

- Ministère chargé de la santé. [Prise en charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase épidémique de COVID-19 – version du 4-04-20](#)
- HCSP. [Coronavirus SARS-CoV-2 : critères cliniques de sortie d'isolement des patients infectés. 16-03-20](#)
- Ministère chargé de la santé. [Recommandations pour le secteur SSR dans le contexte de l'épidémie COVID-19 – 24-03-20](#)
- Ministère chargé de la santé. [Foire aux questions – consignes relatives aux visites et aux sorties dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées -13-03-20](#)
- HCSP. [Prévention et PEC des patients à risque de formes graves et priorisation des tests diagnostiques. 31-03-20](#)