

# Principales causes d'épidémies de COVID dans les établissements de santé et médico-sociaux

## Région Nouvelle-Aquitaine

Novembre 2020



### Causes immédiates

#### Professionnels

Contamination **en dehors des soins**, dans les **lieux clos**, sans port de **masque** et sans **distanciation** : Transmissions, pauses, repas, vestiaires, covoiturage

#### Professionnels

Contamination directe **lors des soins**, lors de **contacts rapprochés prolongés** (**Manipulation du masque** sans hygiène des mains associée, Absence de **protection oculaire** quand patient sans masque, FFP2 porté sans fit-test/check)

#### Patients/Résidents

Contamination par des **visiteurs contacts COVID ou COVID+**, ou lors d'**autorisations de sortie** (non respect des mesures barrières)

#### Patients/Résidents

Contamination lors des **déambulations et/ou activités collectives** (absence de **masque** ou **manipulation** du masque sans **hygiène des mains** associées)

### Causes profondes

#### Professionnels

- \* Baisse de vigilance hors soins, la nuit, le WE
- \* Sous-estimation/minimisation du risque
- \* Manque de formation pour certains
- \* Focalisation sur le masque
- \* Sous-estimation du risque de manuportage
- \* Défiance vis-vis du matériel de protection

#### Patients/Résidents

- \* Niveau d'autonomie (déambulation, capacité à respecter les mesures)
- \* Soins lourds

#### Visiteurs

- \* Sous-estimation / minimisation du risque
- \* Sentiment de ne pas être concerné
- \* Mauvaise perception de l'impact que peut avoir son comportement sur l'ensemble de la collectivité

#### Institution

- \* Impréparation/absence d'anticipation
- \* Sous-estimation du risque
- \* Culture du risque non développée
- \* Sous-effectifs, capacité de remplacement des professionnels absents
- \* Charge en soins
- \* Architecture des locaux/chambres doubles
- \* Absence de leadership encadrement, absence de professionnel encadrant qualifié, de MedCo
- \* Capacité de gestion de la crise
- \* Pas de demande d'aide

### Axes d'amélioration

#### Professionnels, patients/résidents, familles/visiteurs

Maitrise des gestes barrières : sensibilisation, compréhension

#### Donner du sens aux mesures de prévention

... et éviter la surenchère d'EPI

#### Renforcer le message sur l'hygiène des mains

Contamination via les mains portées au visage

#### Enjeu de la supervision des visites en secteurs de moyen et long séjour

#### Masques

Positionnement correct, gestion adaptée, manipulation associant hygiène des mains, renouvellement plus fréquent, FFP2 et faux sentiment de sécurité

Stratégie adaptée de dépistage des patients/résidents et des professionnels