

INFECTIONS URINAIRES DE LA FEMME ENCEINTE

RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE DE LANGUE FRANÇAISE (SPILF)
ACTUALISATION 2021

Mise à jour : 7 février 2023

La grossesse constitue un facteur de risque de complication de la cystite aiguë.

COLONISATION URINAIRE GRAVIDIQUE

DIAGNOSTIC

Patiente asymptomatique

EXAMEN

ECBU présentant une bactériurie > 10^5 UFC/ml

TRAITEMENT ADAPTÉ À L'ECBU

1 ^{ÈRE} INTENTION	2 ^{ÈME} INTENTION
Amoxicilline 1g 3 fois par jour sur 7 jours	Pivmécillinam 400mg 2 fois par jour sur 7 jours

Les posologies journalières sont indiquées pour un adulte de poids normal à fonction rénale normale.

Pour les traitements de 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} intention, consultez le site antibioclitic.com

SUIVI

ECBU de contrôle à J8-J10 post traitement
Puis ECBU mensuel tout au long de la grossesse



ANTIBIOCLIC.COM

OPTIMISEZ VOTRE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques

À **usage** unique des **professionnels de santé**

Son contenu suit les **dernières recommandations** françaises en vigueur.

Le contenu du site ne se substitue pas à la responsabilité de prescription du médecin.

Support réalisé avec la collaboration du Département de Médecine Générale de l'Université de Bordeaux



DIAGNOSTIC

- Brûlures et douleurs à la miction et/ou pollakiurie et/ou impériosité mictionnelle, hématurie macroscopique (fréquente, environ 30 % des cas)
- **Présence d'au moins un des facteurs de risques de complication**

EXAMEN

ECBU puis traitement probabiliste

TRAITEMENT

Traitement probabiliste

1 ^{ÈRE} INTENTION	2 ^{ÈME} INTENTION
Fosfomycine-trométamol 3g dose unique	Pivmécillinam 400mg 2 fois par jour sur 7 jours

Adaptation secondaire

[si échec des traitements probabilistes ou si bactérie résistante au traitement probabiliste]

1 ^{ÈRE} INTENTION	2 ^{ÈME} INTENTION
Amoxicilline 1g 3 fois par jour sur 7 jours	Triméthoprime seul 300 mg/j sur 7 jours (contre-indiqué pendant le 1 ^{er} trimestre de grossesse)

La durée de traitement antibiotique mentionnée est la durée totale de traitement efficace (incluant la durée du traitement probabiliste). Les posologies journalières sont indiquées pour un adulte de poids normal à fonction rénale normale.

SUIVI

ECBU de contrôle à **J8-J10 post traitement**

Puis **ECBU mensuel** jusqu'à l'accouchement

CONDUITE À TENIR



Les fluoroquinolones n'ont plus de place, aujourd'hui, dans le traitement des cystites avec ou sans facteurs de risque de complications.



Pr Jean-Philippe JOSEPH

Professeur de Médecine générale,
Directeur du Département de Médecine générale, Université de Bordeaux



ANTIBIOCLIC.COM : POUR OPTIMISER VOTRE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE