



# ENQUÊTE PERTINENCE DE LA POSE D'UN CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

## Objectif

Identifier la prévalence des patients porteurs de cathéter veineux périphérique (CVP) et la prévalence de la pertinence de pose de ces CVP.

Permettre aux spécialistes de la prévention des infections d'obtenir des éléments chiffrés sur la pose des CVP afin d'aider à cibler le ou les services sur lesquels une analyse complémentaire pourra être menée.

## Population

Etablissements de santé. Possibilité d'intégrer les services des urgences (inclusion des patients ayant été pris en charge).

## Quand

A l'occasion de l'enquête de prévalence ou de façon indépendante à tout moment. Les évaluations peuvent être répétées.

## Mise en oeuvre dans les services

Après avoir informé l'équipe de soins, le référent de l'enquête se rend dans chaque service un jour donné, il note le nombre de patients, identifie les patients porteur d'un CVP et recherche pour ces derniers le lieu de pose du CVP. Si ce dernier a été posé dans le service, il recherche alors dans le dossier du patient l'indication de la pose pour évaluer sa pertinence, et la présence d'une prescription médicale. La pertinence du maintien n'est pas évaluée ici.

### Indications pertinentes pour la pose d'un cathéter veineux périphériques

Indications élaborées à partir de **l'enquête de pertinence du maintien du CPiAS Occitanie** et d'une revue d'experts réalisée pour une **enquête de pertinence menée au CHU de Rouen** :

- Voie orale impossible (nausée, vomissements, troubles de la déglutition, coma, troubles de la vigilance, patient à jeun)
- Instabilité hémodynamique et/ou métabolique ou post-opératoire immédiat (24h à 48h) : couvre notamment les indications liées à une incertitude d'évolution clinique sur une très courte durée
- Réalisation de bilan sanguin multi-prélèvements
- Traitement intraveineux récent < ou =48h avec maintien de la voie orale incertaine
- Produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang (+/- 24h)
- Réhydratation, rééquilibration hydroélectrolytique, remplissage vasculaire,
- Traitement en perfusion continue (seringue auto-pousseuse)
- Produit de contraste (imagerie prévue dans les 48h)
- Autre traitement intraveineux administrable uniquement par voie parentérale
- Produits administrables per os mais biodisponibilité diminuée

Si le CVP n'a pas été posé dans le service, c'est-à-dire qu'il a été posé : dans un autre service de l'établissement, ou dans un autre établissement, ou posé en extérieur par les pompiers ou le SMUR, alors le référent cherche à savoir si la pertinence de la présence du cathéter a été évaluée à l'arrivée du patient (mot dans le dossier, justification clinique...).

Un retour sera à faire aux équipes concernées. L'objectif attendu est celui d'une pose pertinente pour 100% des cathéters. Un chiffre inférieur engage les référents à échanger avec les équipes et à initier des actions de surveillance, formation et sensibilisation. La liste des outils disponibles est accessible sur la page dédiée du CPias Nouvelle-Aquitaine **Cathéter veineux périphérique - CPias Nouvelle Aquitaine (cpias-nouvelle-aquitaine.fr)**

## Spécialités (celles de l'enquête de prévalence - HAD incluse - + urgences)

<b>Médecine</b>		<b>Chirurgie</b>	
Cancérologie, oncologie médicale	01	Chirurgie cardiaque	33
Cardiologie, cardio-vasculaire	02	Chirurgie cardio-vasculaire	34
Dermatologie, vénéréologie	03	Chirurgie digestive	35
Endocrinologie, nutrition	04	Chirurgie générale	36
Gastro-entérologie, hépatologie	05	Chirurgie infantile / pédiatrique	37
Gynécologie médicale	06	Chirurgie orthopédique et traumatique	38
HAD	07	Chirurgie plastique et reconstructrice	39
Hématologie	08	Chirurgie thoracique	40
Maternité	09	Chirurgie vasculaire	41
Maladies infectieuses et tropicales	10	Généco-obstétrique	42
Médecine interne	11	Neuro-chirurgie	43
Néonatalogie	12	Ophthalmologie	44
Néphrologie	13	O.R.L.	45
Neurologie	14	Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale	46
Pédiatrie	15	Urologie	47
Pneumologie	16	Soins intensifs / Soins continus	54
Polyvalente	17	<b>Grefe</b>	
Rhumatologie	18	Greffes cardiaques	48
Rééd. fonctionnelle, SSR, convalescence	19	Greffes de moelle	49
Gériatrie, SLD	20	Greffes rénales	50
Psychiatrie	21	Greffes hépatiques	51
Gériatrie court séjour	22	<b>Autres</b>	
Soins intensifs / Soins continus	53	Autres	52
<b>Réanimation</b>		Urgences	55
Réanimation cardiologique	23		
Réanimation chirurgicale	24		
Réanimation infantile / pédiatrique	25		
Réanimation médicale	26		
Réanimation néonatale	27		
Réanimation néphrologique	28		
Réanimation neurologique	29		
Réanimation polyvalente	30		
Réanimation pneumologique	31		
Réanimation brûlés	32		

## Accès à l'application

L'inscription à l'application se fait en ligne en autonomie sur le site du CPias Nouvelle-Aquitaine. **A l'occasion de l'enquête de prévalence ou de façon indépendante à tout moment. Les évaluations peuvent être répétées.**

Les identifiants pour l'enquête régionale de prévalence en Nouvelle-Aquitaine permettent d'accéder directement à l'enquête. Cette enquête est ouverte à tous et n'est pas réservée à la Nouvelle-Aquitaine.

Une fois connecté, le référent saisit des données agrégées pour chaque service dans l'application en ligne et bénéficie d'un poster de résultats automatisé par établissement et par service.



# ENQUÊTE PERTINENCE DE LA POSE D'UN CVP

## FICHE SERVICE POUR LA SAISIE DANS L'OUTIL CPIAS

Date de l'enquête      JOUR    /    MOIS    /    ANNÉE  
\_\_\_\_\_

Nom du service      \_\_\_\_\_

Spécialité      \_\_\_\_\_

Nombre de patients présents le jour de l'enquête      \_\_\_\_\_

Nombre de patients porteurs d'au moins un CVP le jour de l'enquête      \_\_\_\_\_

Nombre de CVP comptabilisés le jour de l'enquête      \_\_\_\_\_

Nombre de CVP posés dans le service  
dont      \_\_\_\_\_

    Nombre de CVP ayant fait l'objet d'une prescription médicale      \_\_\_\_\_

    Nombre de CVP pour lesquels l'indication de pose était pertinente      \_\_\_\_\_

Nombre de CVP posés dans un autre service  
dont      \_\_\_\_\_

    Nombre de CVP pour lesquels la pertinence de la présence a été  
    évaluée à l'arrivée du patient      \_\_\_\_\_

Commentaires (factultatif)

---

---

---

Pour toute question

[cpias.na@chu-bordeaux.fr](mailto:cpias.na@chu-bordeaux.fr)



# ENQUÊTE PERTINENCE DE LA POSE D'UN CVP

FICHE DE RECUEIL CVP - À PRENDRE DANS LE SERVICE LE JOUR DE L'ENQUÊTE

JOUR / MOIS / ANNÉE

Date de l'enquête

Nom du service

Spécialité

Nombre de patients présents le jour de l'enquête

Nombre de patients porteurs d'au moins un CVP le jour de l'enquête

Nombre de CVP comptabilisés le jour de l'enquête

Remplir un questionnaire « CVP » pour chaque cathéter veineux périphérique porté par un patient le jour de l'enquête (entourer les bonnes réponses). Utiliser plusieurs fiches de recueil si plus de 5 cathéters.

## CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

## CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

## CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

## CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

## CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

OUI NON

CVP posé dans le service ?

Si CVP posé dans le service :

Il y a une prescription médicale pour ce CVP

L'indication de la pose de ce CVP était pertinente

Si CVP posé dans un autre service :

A l'arrivée du patient, la pertinence de la présence du cathéter en place a été évaluée

Pour toute question

[cpias.na@chu-bordeaux.fr](mailto:cpias.na@chu-bordeaux.fr)

Pertinence de la pose d'un CVP

Version du 8 octobre 2024